


鎮痛消炎薬

うちみ・ねんざ・筋肉痛・肩こり・腰痛



● はがしぐちテープを取り除いて貼って下さい。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この袋を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても、症状がよくなる場合

成分及び分量 膏体 100g 中

サリチル酸グリコール …………… 1.000 g
dl-カンフル …………… 0.200 g
l-メントール …………… 0.300 g
トコフェロール酢酸エステル ……… 0.300 g

添加物として、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸部分中和物、ゼラチン、カオリン、CMC-Na、酸化チタン、カルボキシビニルポリマー、ポリソルベート80、pH調整剤、ジヒドロキシアルミニウムアミノアセテート、オレイン酸ソルビタン、香料を含有する。

効能又は効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、関節痛、骨折痛、腰痛、筋肉疲労

用法及び用量

1日1～2回、膏面のライナーをはがし、患部にはる。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 多量の汗をかくことが予想される場合は、膏体がやわらかくなりすぎる可能性がありますので、使用をお控えください。
- (4) 粘着テープ等でかぶれやすい人は使用しないでください。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は袋の口を折り曲げて保管すること。
- (5) 配置期限を過ぎた製品は使用しないこと。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口

電話:076-479-1313

受付時間 9:00～17:00

(土、日、祝日を除く)