

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

第②類医薬品

## 確力<sup>®</sup>ヨワン錠 鎮うん薬

確力ヨワン錠は、旅行などの乗り物酔いに起こるつらい症状を予防・緩和させるお薬で、めまい・吐き気・頭痛に良く効きます。

### 〔 使用上のご注意〕

#### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないで下さい。  
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等）
- 2.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。  
(眠気があらわれることがあります)
- 3.授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けて下さい。  
(母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります)
- 4.服用前後は飲酒をしないで下さい。



#### 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1)医師の治療を受けている人。
  - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - (4)次の症状のある人。  
排尿困難
  - (5)次の診断を受けた人。  
緑内障、てんかん、甲状腺機能障害
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。





関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
循環器	どうき
泌尿器	排尿困難

- 3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。  
□のかわき、眠気

## 効能・効果

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

## 用法・用量

おとな(15歳以上) 	1回2錠 
こども(7~14歳) 	1回1錠 

乗物酔いの予防には乗車船30分前に、左記1回量を服用して下さい。なお、症状発現時に追加服用する場合には、1回量を4時間以上の間隔をおき服用して下さい。

1日の服用回数は3回を限度として下さい。

●小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

●用法・用量をお守り下さい。

●内服にのみ使用して下さい。

## 成分・分量

本品1日量(6錠)中

成分	分量	作用
ジフェンヒドラミンサリチル酸塩	120mg	乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛を緩和します。
ジプロフィリン	90mg	
プロモバレリル尿素	180mg	穏やかな催眠・鎮静作用があります。

添加物として、乳糖水和物、アルファー化デンプン、セルロース、タルク、ステアリン酸Mgを含む。

## 保管・取扱上の注意

- (1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4)使用期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。

## 消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 株式会社 廣 昌 堂 富山県射水市水戸田2841

☎ 0766-54-1007

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)