

# お子さまのかぜに こどもかぜカイセイII

第2類医薬品

かぜ薬

こどもかぜカイセイは、発熱・鼻水・せきなどかぜから起こるいろいろな症状に効果がある、溶けやすく、飲みやすい顆粒状のおくすりです。

## ⚠️ 使用上の注意

\*本剤は小児用のお薬ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 次の人は服用しないで下さい。

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬等)

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。

4. 服用前後は飲酒をしないで下さい。

5. 長期連用しないで下さい。

### 相談すること



1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
- (5) 次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合には副作用の可能性があるため、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

| 関係部位  | 症 状         |
|-------|-------------|
| 皮膚    | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器   | 吐き気・嘔吐、食欲不振 |
| 精神神経系 | めまい         |
| 泌尿器   | 排尿困難        |
| その他   | 過度の体温低下     |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

| 症状の名称   | 症 状   |
|---|---|
| ショック<br>(アナフィラキシー)  | 服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる                                |
| 皮膚粘膜眼症候群<br>(スティーブンス・ジョンソン症候群)、<br>中毒性表皮壊死融解症、<br>急性汎発性発疹性膿疱症 | 高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ(小膿疱)が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する |
| 肝機能障害   | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる  |
| 腎障害   | 発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる  |
| 間質性肺炎   | 階段を上ったり、少し無理をすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする                            |
| ぜんそく  | 息をするときせーせー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる  |
| 再生不良性貧血   | 青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる                          |
| 無顆粒球症   | 突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる  |

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

口のかわき、眠気



4. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和



## 用法・用量

|       |  |
|-------|--|
| 年齢区分  | 1回量  |
| 7～14才 |  1包   |
| 3～6才  |  2/3包 |

左記1回量を、1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

●保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

●用法及び用量をお守り下さい。

●3才未満のお子さまには服用させないで下さい。

## 成分・分量

本品1日量(3包)中

1包量1g

| 成分                          | 分量    | 作用                            |
|-----------------------------|-------|-------------------------------|
| アセトアミノフェン                   | 300mg | 熱を下げ、頭痛・のどの痛み関節の痛みに効果があります。   |
| クロルフェニランミンマレイン酸塩            | 2.5mg | くしゃみ・鼻水・鼻づまりの症状を改善します。        |
| チペピジンヒベンズ酸塩                 | 25mg  | せき、たんに効果があります。                |
| ニンジンエキス(原生薬ニンジン880mgに相当します) | 80mg  | 古くから滋養・強壮効果が知られている動・植物性の成分です。 |
| ゴオウ末                        | 2.5mg |                               |

添加物としてD-マンニトール、乳糖水和物、バレイショデンプン、サッカリンナトリウム水和物、香料を含有します。

## 保管・取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4) 使用期限(配置期限)の過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用して下さい。

## 消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 株式会社 廣 昌 堂 富山県射水市水戸田2841

☎ 0766-54-1007

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)