

服用前にこの説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう保管してください。

かぜの諸症状の緩和に **<かぜ薬>**

第②類医薬品

ピラトン21カプセル

解熱作用のある ゴオウ、ジリュウエキス せきに効く ジヒドロコデインリン酸塩 配合



使用上の注意

⊗ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります〕

1. 次の人は服用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。
（眠気等があらわれることがあります）
4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
5. 服用前後は飲酒しないでください。
6. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊娠又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 授乳中の人。
 - (4) 水痘（水ぼうそう）若しくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）。
 - (5) 高齢者。
 - (6) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (7) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
 - (8) 次の診断を受けた人。
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍・緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症、 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
便秘、口のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果 かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

用法・用量 1日3回食後なるべく30分以内に服用してください。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
15歳以上(成人)	2カプセル	3 回
7歳以上15歳未満	1カプセル	
7歳未満	服用させないこと	

- (1) 用法及び用量をお守りください。
(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3) 7歳未満の小児には服用させないでください。

成分・分量 1日量6カプセル中

成 分	分 量	は た ら き
アセトアミノフェン	530mg	痛みをおさえ、熱をさげます。
エテンザミド	400mg	痛みをおさえ、熱をさげます。
無水カフェイン	75mg	頭痛をやわらげます。
DL-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg	せきをしずめます。
ジヒドロコデインリン酸塩	16mg	せきをおさえ、呼吸を楽にします。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	鼻水、鼻づまり、くしゃみをおさえます。
ジリュウエキス散 (原生薬換算量 400mg相当量)	200mg	熱をさげます。
ゴ オ ウ	3mg	熱をさげます。

添加物として、結晶セルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、CMC-Ca、乳糖水和物、バレイショデンプン、カプセルにはゼラチン、黄色5号、ラウリル硫酸Na、酸化チタンを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ換えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
(4) 配置期限を過ぎた製品は服用しないでください。

〔消費者相談窓口〕

源平製薬株式会社

電話番号 0766-56-0239

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元

源平製薬株式会社

富山県射水市黒河新2643

副作用被害救済制度

☎0120-149-931