

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また、必要ときに読めるように大切に保管して下さい。

か ぜ 薬

第②類医薬品

# 漢方処方配合 ポジゴールド®「顆粒」

本剤は、漢方薬「柴胡桂枝湯」（さいこけいしとう）をはじめ、かぜから起こる鼻水・せき・発熱・頭痛などいろいろな症状にすぐれた効果のある成分を配合した溶けやすく、のみやすい顆粒状のお薬です。

## 〔△使用上のご注意〕

### ❌してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

- 次の人は服用しないで下さい。
  - 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
- 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないで下さい。  
他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）
- 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい。（眠気があらわれることがあります）
- 服用前後は、飲酒をしないで下さい。
- 長期連用しないで下さい。



### 相談すること

- 次の人は、服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - 医師又は、歯科医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 授乳中の人。
  - 水痘（水ぼうそう）もしくはインフルエンザにかかっている又はその疑いのある乳・幼・小児（15才未満）
  - 高齢者
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
高熱、排尿困難。
  - 次の診断を受けた人。  
甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難、頻尿、排尿痛、血尿、残尿感
その他	過度の体温低下

まれに、下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮ふの広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮ふ上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮ふや白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。

腎障害	発熱、発疹、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛(節々が痛む)、下痢等があらわれる。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮ふや粘膜が青白く見える、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。口のかわき、眠気
- 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

## 効能・効果

かぜの諸症状(鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

## 用法・用量

年齢区分	1回量
15才以上	1包
11才以上～15才未満	2/3包
7才以上～11才未満	1/2包
3才以上～7才未満	1/3包

左記1回量を1日3回食後なるべく30分以内に服用して下さい。

- お子さまに服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- 用法及び用量をお守り下さい。
- 3才未満のお子さまには服用させないで下さい。

## 成分・分量

本品1日量(3包)中

1包量1.8g

成分	分量	作用										
アセトアミノフェン	450mg	熱を下げ、頭痛・のどの痛み・関節の痛みに効果があります										
エテンザミド	750mg	痛みに効果があります										
ノスカピン	30mg	中枢神経に作用してせきをしずめます										
dL-メチルエフェドリン塩酸塩	30mg	せき、たんに効果があります										
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg	くしゃみ・鼻水・鼻づまりの症状を改善します。										
柴胡桂枝湯エキス	840mg	柴胡桂枝湯(さいこけいしとう)は、漢方薬の古典である「傷寒論」などに記載されている重要な漢方処方方で、かぜから起こるいろいろな症状に対し応用されています。										
<table border="0"> <tr> <td>柴胡 1.0g</td> <td>人参 0.4g</td> </tr> <tr> <td>半夏 0.8g</td> <td>大棗 0.4g</td> </tr> <tr> <td>桂皮 0.6g</td> <td>甘草 0.4g</td> </tr> <tr> <td>芍薬 0.6g</td> <td>生姜 0.2g</td> </tr> <tr> <td>黄芩 0.4g</td> <td></td> </tr> </table>	柴胡 1.0g	人参 0.4g	半夏 0.8g	大棗 0.4g	桂皮 0.6g	甘草 0.4g	芍薬 0.6g	生姜 0.2g	黄芩 0.4g			
柴胡 1.0g	人参 0.4g											
半夏 0.8g	大棗 0.4g											
桂皮 0.6g	甘草 0.4g											
芍薬 0.6g	生姜 0.2g											
黄芩 0.4g												
以上生薬より抽出したエキス												
ヘスペリジン	90mg	成分の吸収を高めるなど、他の成分の働きを助けます。										
無水カフェイン	150mg											

添加物として、セルロース、ケイ酸Al、乳糖水和物、水酸化Al、炭酸水素Na、バライシヨデンブンを含有する。

## 保管・取扱上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)
- (4) 配置期限の過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5) 1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用して下さい。

## 消費者ご相談窓口

本剤をご使用になり、何かお気づきの点がございましたら下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 株式会社廣昌堂 富山県射水市水戸田2841

T E L 0766-54-1007

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)